



KANSER SERVIKS

KLINIK
PELAJAR

FAKTA KANSER SERVIKS



kanser kedua
terbanyak
dikalangan
wanita

lebih 500,000
wanita mendapat
kanser pangkal
rahim dengan
275,128 kematian
dilaporkan di
seluruh dunia.

kanser serviks
adalah satu-
satunya kanser
yang disebabkan
oleh jangkitan
virus HPV
(*human
papilloma virus*)
dan ia boleh
dicegah
daripada awal.

FAKTA KANSER SERVIKS



99.7% daripada kanser servik mempunyai kaitan dengan virus HPV



Tahun 2010 - penyebab kematian no 1 didunia terutama dikalangan wanita




FAKTA WHO :

- 4 KES BARU SETIAP MINIT
- 1 WANITA MENINGGAL DUNIA SETIAP 2 MINIT.



FAKTA DI MALAYSIA




1300 WANITA
DIDIAGNOSIS
KANSER SERVIKS
SETIAP HARI




- 750 WANITA MENINGGAL
DUNIA SETIAP HARI
AKIBAT KANSER SERVIKS

FASA KANSER SERVIK (PANGKAL RAHIM)



- **Peringkat awal**
 - Berlaku di sekitar servik



- **Peringkat lewat**
 - Merebak ke tisu-tisu berhampiran atau organ tubuh yang lain seperti paru-paru melalui sistem aliran darah

FAKTOR RISIKO KANSER SERVIKS



TANDA-TANDA GEJALA KANSER SERVIKS

Kebiasaannya
tiada
tanda/gejala

Rasa sakit
semasa
melakukan
perhubungan
seks.


Sebarang
perdarahan
selepas putus
haid.

Lelehan faraj
yang berair
dan berbau
busuk.

Perdarahan
selepas
perhubungan
seks.

Pendarahan
abnormal
antara waktu
haid


LANGKAH PENCEGAHAN




UJIAN PAP SMEAR



- Boleh mengesan barah pangkal rahim pada peningkat awal
- Cadangan :
 - Setiap tahun – untuk 3 tahun pertama(jika normal) teruskan ...
 - Setiap 3 tahun





PANDUAN SEBELUM LAKUKAN UJIAN PAPSMEAR



Waktu yang sesuai adalah pertengahan atau selepas 10 hari kitaran haid.

Tidak digalakkan melakukan hubungan seks ***24 jam sebelum ujian***


Jangan gunakan spermicid, vagina gel/krim atau penggunaan jelly 'lubricant' ***2 hari sebelum ujian*** dijalankan



Normal cervix and vagina (cut-away view)




Early stage IB cancer of cervix




Late stage IB cervical cancer




Stage IIB: The cancer spreads outside cervix to pelvic tissue



Normal cervix (speculum view)



Early stage IB cervical cancer



Late stage IB: cervical cancer is still limited to cervix




Stage IIB cervical cancer

BAGAIMANA KALAU SUDAH JADI BEGINI?





镜下见每个乳头形态相似，
未见血管祥，涂醋酸后变白。





DAN BEGINI?





PERANGI KANSER SERVIK

