

BAHAYA ROKOK



DISEDIAKAN OLEH KLINIK PELAJAR

PENGENALAN ROKOK



PEMBUNUH
BAGI 4 JUTA
ORANG
SETIAP
TAHUN

PENYEBAB
UTAMA 10
SEBAB
KEMATIAN
DI DUNIA

KEMATIAN AKIBAT ROKOK (BERDASARKAN FAKTA WHO)

4.9 juta kematian
dalam thn 2002


- 13 400 kematian sehari
- 560 kematian sejam
- 1 kematian setiap 6.4 saat

27 400
kematian
sehari


1
kematian
setiap 3
saat

Anggaran
2030 → 10
juta
kematian

2280
kematian
sejam



KEMATIAN AKIBAT ROKOK




KANDUNGAN ROKOK




Chemicals included in tobacco smoke

BAHAYA ROKOK

KANSER



BAHAYA ROKOK



KADAR RISIKO MAUT AKIBAT ROKOK

PENYAKIT	RISIKO KEMATIAN
Saluran pernafasan kronik	10 -20 X ganda
Kanser paru - paru	7 -15 X ganda
Kanser payu dara	11 X ganda

KADAR RISIKO MAUT AKIBAT ROKOK

PENYAKIT	RISIKO KEMATIAN
Kanser tekak	5 -13 X ganda
Kanser mulut	3 -15 X ganda
Kanser esofagus	4 - 5 X ganda

KADAR RISIKO MAUT AKIBAT ROKOK

PENYAKIT	RISIKO KEMATIAN
Kanser pankreas	2 X ganda
Kanser pundi kencing	2 - 3 X ganda
Penyakit jantung	1 1/2 - 3 X ganda

KADAR RISIKO MAUT AKIBAT ROKOK

PENYAKIT

RISIKO KEMATIAN

Penyakit ginjal

1 1/2 X ganda

Penyakit ulser
peptik

2 X ganda

RISIKO ROKOK KETIKA HAMIL



KEGUGURAN JANIN

25% - 50% KEMATIAN NEONATAL

KELAHIRAN PREMATURE (TIDAK CUKUP BULAN)

MERENCATKAN TUMBESARAN BAYI

**MENINGKATKAN RISIKO JANGKITAN PARU –
PARU**

SINDROM KEMATIAN BAYI (SIDS)

**KURANGKAN KEUPAYAAN JANTUNG DAN
PARU-PARU BAYI**

RISIKO PEROKOK PASIF YANG HAMIL


KELAHIRAN
PREMATURE

TUMBESARAN
BAYI TERJEJAS

KADAR
KEMATIAN
PERINATAL
YANG TINGGI

JANGKITAN
PARU-PARU
DAN TELINGA
SELEPAS LAHIR


BAYI LAHIR
BERAT
BERKURANGAN





CHRONIC OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASE:

SEJENIS PENYAKIT SEKATAN SALURAN PERNAFASAN , YANG AKAN MENYEBABKAN PESAKIT BERGANTUNG HAYAT PADA OKSIGEN SEUMUR HIDUP DAN TERLANTAR DI HOSPITAL




COAD: GAMBARAN X RAY -
HYPERINFLATED

LUNG KANSER





COAD: CROSS
SECTION PARU-
PARU PESAKIT




CROSS
SECTION
NORMAL
LUNG

COAD:
TERMINAL
AND END
STAGE,
SHRUNKEN
LUNGSPACE






SVC
OBSTRUCTION



g. 132 Primary bronchial carcinoma:
cidental finding in a 45-year-old smoker



KANSER
PARU –
PARU :
LATE
STAGE

KANSER MULUT




the retractor below
the incision


the incision
the retractor

Copyright © 2000 by W.B. Saunders Company

KANSER
MULUT



Tobacco use is associated with increased risk of cancers of the lung, mouth and esophagus







PENYAKIT ARTERI :
ROSAK SALURAN
DARAH DI HUJUNG

BUERGER'S DISEASE:
KEROSAKAN SALUR
DARAH MENYEBABKAN
GANGREN TISU





KEGUGURAN BAYI : KESAN
AKIBAT IBU MEROKOK ATAU
IBU
MENGANDUNG TERDEDAH
PADA ASAP ROKOK



HYDROP FETALIS:
EDEMA/BENGGKAK
BAYI DALAM
KANDUNGAN
MENYEBABKAN BAYI
MATI DALAM PERUT

KOMPLIKASI KEPADA BAYI PEROKOK.....



BAYI PRAMATANG




BAYI KURANG BERAT
BADAN

KANSER PANGKAL RAHIM : PEMBUNUH KEDUA WANITA ..AKIBAT MEROKOK DAN BERSUAMIKAN PEROKOK


KANSER




KANSER LARYNX



KANSER LEHER



TANNERY & GLUE BOILERS



"I hope you're not thinking of smoking that filthy thing in here!"



If you
smoke
quit.

If you
don't
smoke do
not start.

Your life
and family
depends
upon it.

**This New Year, Why Not Make a
Truly Meaningful Resolution
For You and Your Family...**



Quit Smoking

+ **AMERICAN
LUNG
ASSOCIATION®**
of Kentucky

For More Information Call
American Lung Association
1-800-LUNG-USA

